Verjus

*2868Mtp1

2868MTP1

2868MTP1

Collection Vassal-Montpellier

2 R Derjus S. 436, 440

Verjus Vass2R02s436-440









Verbis DESIGNATION CLOS & PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 3 Vigueur : 2 PORT : frig - + érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0,5 Date de Véraison : 2 9 Date de Maturité : 29-9-69 + 6 Pourriture : 91 GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - (- M - P 70 X17 disc. - sph. - (11) - ov. obov + cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 1 1 avec pépins apyrène SZ s 30 JUS : (inc) - coloré

Verjus DESIGNATION CLOS & PLANCHE & RANG A souche 3 Vigueur : 3 PORT : érig (½ érig - couché. Pédoncule : (L) M - C. Millerandage: Date de Véraison : 4.8 Date de Maturité: 19.9.70 +7 Pourriture 21 06 10. 9. 70-GRAPPE (TG)-M-P: L-M-C. BAIE: TG - G - M P.6

disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BL) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec pépins - apyrène. s2s36 JUS : inc. / - coloré. 34 6 s5 /

```
Verjus
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 3
Vigueur : 3
PORT : érig - érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : O
Date de Véraison: 238,71
Date de Maturité : 27-9-11
Pourriture :0
GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G 22×19 P
    disc. - sph. - 611 - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
's2 2
      avec pépins - apyrène
s30
      JUS : inc. - coloré
$40
```

Année / 1969
Emplacement . 4.14 Ag Désignation .. Nerfin ...

	Nombre total	Dates						
		4.4.	!!	!!!!!	!			
1	4	2 !	/ !	1 !	\$,		
2	! ! 9 !	! !	pe 4. 4.69	!!!!	!			
3	:)	! !	De 4 +12	!!!!	!			
4	! 5	1	!	!!!!				
5	!	!	1	! !	1			

Année: 1970 Emplacement 4.14.A3..... Désignation /.. Verjus...

	1	Nombre Total	!		D A T	E S			
	. 1	d'yeux	189	1 13-4	1174	1	· !	!!	
1	1	4	! 1	! 1	: 3	!	!	!	
2	!	·	!	!	1	1	!		
2	/!	0/	!	!	!	!	1	!	
4		8	1	1	1	4	!	1	
15	/!	V	!	[!	1	!	!	
====	=====	to below only some and begin your like your	!=====	=!=====		5-4.	!	! ! ! ! ! !	===

De 15-4.70 +19

Année: 1971
Emplacement 4.14.43 Désignation .Verjus......

1 1	Nombre ! Total	DATES!					
1	d'yeux	343	2.4	: 64	!		
1 7 1	1	!		Ţ	!	! !	
2 / 1	!	Ĭ		1	!	i	
3 1	K			1	!		
4 3 1	*	*		İ	1	1 / 1/x (4 I)	
5 !	4	Ms.	1	! 9	1×	06 6-4-4X (+7)	

Verjus 4.14 A3 s. 1

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Verjus

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANDAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé () trista

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo to

Désignation : Emplacement : Verjus 4.14A3A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5, 51 - nocuds

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Verjus 4.14A3 2.1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

		FIGURE ADOLLERS
00101	nno	
34	**	potite 1 - nevenne 2 grande 3.
		Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34	~	Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35	-	limbo: glabro 4 - sétoux 5 - volouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9
,		Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5
		Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5
36	1	Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6,
37	-	Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 tratièrement rouge 4.
38	m-4	Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
		Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autro 5.
		PETIOLE
39	-	long 1 - moyen 2 - court 3.
39	-	glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.
40	-	aranéeux ()- duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ()- totalement 8.
40	-	coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
		angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
		angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Lerjus

GRAPPE

24 - Grosse () - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

19016

26 - Très grosso 1 - Grosso 2 - Moyenno 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 0 - fade 2 - musquéo 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré ()

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

·Calvo

DENCHMATICH / Veryus
EMPLACEMENT / 4.14 A3 S.5

SARHENT DE VIGNE

: long (moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), ale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocues : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

Désignation: Verjus và Origine : Emplacement: d4 pl 14 A3 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L 0 - 2 - 3. 10 - L₂/L ① -②. 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 -1 - 2 -3 - 4 -5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (1) - (8) - (9) 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

2868

No d'ordre :

Domerque 30

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année : 2005

Code cépage : 2868Mtp1

Code introduction:

Nom introduction: Verjus

Emplacement: Vass2R02s436-440

Observateur: TD

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 72

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 10- très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 2 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 92

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 15- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte D- très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte (7)- très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 10 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209) plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218) très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible (P - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année: 2005

Code cépage : 2868Mtp1 Nom introduction: Verjus

Code introduction:

Emplacement: Vass2R02s436-440

Observateur: TD

Rameau herbacé

oiv 006 port: érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 32 forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible D- moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence Ø - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 2 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence/1 - présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible P- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 15- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud/\$\vec{y}\$ - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 – présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.)

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune 3

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8

(entre stades nouaison et véraison)

Année : 2005
Code cépage : 2868Mtp1
Code introduction :

Nom introduction : Verjus

Code introduction : Emplacement : Vass2R02s436-440

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe: cordiforme 1 - cunéiforme 7 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes: feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe: vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nullés - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II): absente 1 - présente 9.
oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III): absente 1 - présente 9.
oiv 075 cloqûre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre):
nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 19 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 9 - présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 9 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane:

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Autre

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal: Densité poils couchés limbe face supérieure:

nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure:

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 Couleur du pétiole: vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1.

[sinus pétiolaire: ouverture = 1-2-3-4-56) forme = U-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]
[sinus latéraux: ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non]
[dents: forme = concave-rectiligne-rectiligne-cronde-crochue / taille = 1-3-5-7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 5/8 (stade maturité) Année: 2005 Observateur: Code cépage : Code introduction: 2868Mtp1 Nom introduction: Verjus Emplacement: Vass2R02s436-440 Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) (7)- très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 2850. oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 large (15-20 cm) (5) - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 186m oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule: très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement D- moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2) - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 16 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5) forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic: peu apparent 1)- apparent 2. oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2? oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur: aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) - présentes 2. Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 - coloré 1. 000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyen 5 – fort 7 – très fort 9.